

California Blackberry (Mora California)

Rubus Ursinus



Información General

- Frutas agridulces comestibles
- Exposición al sol: sol completo, sombra parcial
- Necesidades de agua: Moderada a alta
- Tolerancia al frío: Tolera frío a 0 grados F
- Días de cosecha: Cuando pueda ser cosechado, coseche cada pocos días
- Temporada de cosecha: Finales de primavera hasta verano, dependiendo de variedad

Guía de siembra

- 3 tipos de moras de CA: Erecta, semi-erecta y posterior
- Tiempo de año de siembra: Plante a principios de la primavera, cuando las cañas están inactivas. En climas más cálidos, también se puede plantar a fines del otoño.
- Ubicación: lugar soleado con suelo bien drenado y lejos de las moras silvestres que pueden causar enfermedades a sus plantas
- Espaciado: Para tipos erectos, plante a 3 pies de distancia, para tipos semi-erectos, plante a 5 a 6 pies de distancia, para tipos de arrastre, plante a 5 a 8 pies de distancia. Asegúrese de que todas las filas estén separadas por 8 pies.
- Triturado: Mantenga una capa gruesa de mantillo alrededor de las plantas en todo momento (~ 3 pulgadas) para conservar la humedad.
- Plante superficialmente, alrededor de 1 pulgada de diferencia con respecto a cuando se plantaron en el vivero.
- Propagación de esquejes de mora:
 - Es mejor usar esquejes de tallos frondosos de una planta de mora establecida
 - Use un esqueje que esté cerca del borde de una zarza sana



- Corte de 4 a 6 pulgadas de los tallos frondosos de la caña para usarlos como corte
- Corte durante el periodo de inactividad de otoño
- **Pasos para Propagación: Preparación para Propagar**
 - Cuando prepare un recipiente para enraizar, llene macetas de 8 pulgadas con una mezcla de turba molida, perlita y arena gruesa.
 - Luego, vierta agua en esta mezcla hasta que la mezcla esté completamente saturada.
 - Por último, deje que el agua se escurra durante 10 minutos, luego haga un agujero de 4 pulgadas de profundidad en el centro de la mezcla.
 - Inmediatamente después de cortar, enjuague los esquejes.
 - Junte los esquejes y guárdelos a una temperatura fría de 40 F en un área seca o en el refrigerador.
 - Frote el extremo cortado del esqueje con talco de la hormona de enraizamiento IBA.
 - Coloque el corte de mora en la olla para que se encuentre con ese agujero central de 4 pulgadas de profundidad.
- **Pasos para propagar: durante la propagación**
 - Asegúrese de colocar estas macetas afuera en un marco frío. Asegúrese de que este marco tenga ventilación en su interior.
 - La técnica del agua a usar aquí es rociar los esquejes, usando una botella rociadora y asegurándose de limpiar la botella antes de usar. Asegúrate de no agregar demasiada agua para que los esquejes no se pudran. Haga esto dos veces al día.
 - Después de un mes, mueva la maceta a un área sombreada.
 - Después de 3 semanas a partir de este momento, tire suavemente del esqueje para asegurarse de que las raíces se hayan establecido.
 - Después de asegurarse de que las raíces se hayan establecido, después de 2 meses, ahora puede mover la planta a un recipiente de vivero de 1 galón que está lleno de partes iguales de marga, abono y arena gruesa.
 - En el verano, asegúrese de cultivar las moras en un área ligeramente sombreada y riéguelas a una profundidad de 2 pulgadas una vez por semana.
 - Día a día, exponga la planta a más y más luz solar hasta que pueda reposar durante 8 horas sin que se quemen las hojas, similar a esta imagen:
 - Alrededor de octubre, transfiera la siembra del contenedor del



- vivero al suelo o al lecho de siembra con suelo ácido de drenaje rápido.
- Agregue estructuras para ayudar al crecimiento de la mora.

Guía de Cuidado

- **Irrigación:** Asegúrese de que las plantas tengan 1 pulgada de agua por semana y potencialmente más en temperaturas más cálidas
- **Fertilizante:** Fertilice a principios de la primavera con fertilizantes para todo uso, como 10-10-10 o 16-16-8
- **Alambrado:** Para los tipos de arrastre, use cableado para mayor soporte de la planta. Utilice un sistema de dos cables, con el primer cable a una distancia de 5 a 6 pies del suelo y los otros 18 pulgadas por debajo del primero
- **Poda:**
 - Empiece a podar 2 años después de la siembra inicial
 - La poda parece ser todo el año, siendo una parte de la temporada el momento de poda más importante.
 - Dos veces durante el año: primavera y verano
 - Mejor tiempo para podar es en el principio de verano, en los meses de **mayo y junio**
 - Poda de invierno:
 - También se puede podar en invierno para promover más fruta en la siguiente temporada de cosecha al eliminar la madera muerta de la fruta.
 - Corta las cañas y ramas muertas con una tijera de podar limpia.
 - Poda de primavera: consejos de poda *tallo podado*
 - Use un par de tijeras de podar limpias y afiladas (asegúrese de limpiar con toallitas desinfectantes o rocíe después de cada planta).
 - En este tipo de poda, vamos cortando las puntas de los bastones de mora.
 - Corte los bastones a aproximadamente 24 pulgadas, y si el bastón mide menos de 24 pulgadas, simplemente pódela pulgada superior del bastón.
 - Poda de Verano: Poda de limpieza
 - Una vez que las moras hayan terminado de dar frutos, corte las cañas que ya produjeron frutos, ya que no podrán volver a dar frutos.
 - Puede distinguir las cañas que dieron fruto del resto observando el espacio entre cada hoja en cada parte del tallo. Si los espacios son muy cortos, eso significa que esa rama acababa de dar fruto. Nota: Esto se aplica solo a las moras floriscane, que aún dan frutos verdes durante el



verano y son el tipo más común de moras. Las moras de primocane tienen un mayor espacio entre sus hojas y no dan frutos en el verano.

- Corte con tijeras de podar limpias, **a nivel del suelo**, las cañas que hayan dado fruto este año.

Fuentes:

[Planting, Growing, and Harvesting Blackberries](#)

[Pacific Blackberry](#)

<https://homeguides.sfgate.com/time-year-trim-blackberry-vines-61074.html>

<https://www.growveg.com/guides/how-to-prune-blackberries-and-raspberries/>

<https://homeguides.sfgate.com/grow-blackberries-cuttings-48501.html>